

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
কীটতত্ত্ব বিভাগ


রোপা আমন ধানে পামরী পোকা দমনে করণীয়

চলতি রোপা আমন মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পামরী পোকাকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পোকা দমনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১) হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।

২) ৩-৮ টি পূর্ণ বয়স্ক পোকা/গোছা, ৮-১০ টি গ্রাব/পাতা অথবা শতকরা ৩৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিম্নের যে কোন একটি কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর	প্রয়োগ মাত্রা/একর
জেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম		
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ এসপি	১.৭ কেজি/হেক্টর	০.৬৮ কেজি/একর
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১.০ লিটার/হেক্টর	০.৪০ লিটার/একর
আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১.১২ কেজি/হেক্টর	০.৪৪ কেজি/একর
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.১২ লিটার/হেক্টর	০.৪৪ লিটার/একর



(ড. শেখ শর্মিউল হক)

সিএসও (অঃ দাঃ) এবং প্রধান
কীটতত্ত্ব বিভাগ
বি, গাজীপুর।