

ধানের পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

১. বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়ি

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- নিয়মিত ধান ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করুন।
- পোকার আক্রমণ অর্ধেন্তিক ক্ষতির দ্বার প্রাপ্তে পৌছিলে (ক্ষেত্রের অধিকাংশ গাছে চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পর্ণবয়ক ঝী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা গাছ ফড়ি বা উভয়ই) পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করুন।
কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
পাইমেট্রেজিন	প্লেনাম ৫০ ড্রিউজি	৫০০ গ্রাম
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.২ কেজি
এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ড্রিউপি	১.৩ কেজি
ইমিডাক্রোপ্রিড	এডমায়ার ২০ এসএল	১২৫ এমএল
এবামেষ্টিন	সানমেষ্টিন ১.৮ ইসি	১.০ লিটার
এসিফেট	এসাটাফ ৭৫ এসপি	৭৫০ গ্রাম
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০ এসপি	৫০ গ্রাম
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.০ লিটার
থায়ামেথোক্রাম	একতারা ২৫ ড্রিউজি	৬০ গ্রাম

২. পাতা মোড়ানো পোকা

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পার্টি করুন।
- ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ এসপি	১.৭ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১.০ লিটার
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ড্রিউপি	১.১২ কেজি

৩. মাজরা পোকা

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন।
- জমিতে পার্টি করুন।
- সংক্ষয়ী সময় আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলুন।
- ধান কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
ক্ষেত্রে মরা শতকরা ১০-১৫ ভাগ অথবা মরা শিষ শতকরা ৫ ভাগ পাওয়া গেলে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
থায়ামেথোক্রাম+	ভিত্তাকো ৪০ ড্রিউজি	৭৫ গ্রাম
ক্লোরান্টানিলিপ্রোল		
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.৪ কেজি
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.৫ লিটার
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১.০ লিটার
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	বেল্ট ২৪ ড্রিউজি	২০০ গ্রাম

৪. পামরি পোকা

- পামরি পোকা আক্রমণ প্রবণ এলাকায় মুড়ি ফসল চাষ পরিহার করুন।
- পামরি পোকার ডিম, কীড়া ও বয়ক পোকা মুক্ত চারা ব্যবহার করুন।
- হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।
- ৩-৮ টি পূর্ণ বয়ক পোকা/গোছা, ৮-১০ টি ছাব/পাতা অথবা শতকরা ৩৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন একটি কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ এসপি	১.৭০ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১.০ লিটার
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ড্রিউপি	১.১২ কেজি
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.১২ লিটার

৫. গাঞ্জি পোকা

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- ২-৩টি গোছায় গড়ে একটি গাঞ্জি পোকা দেখা গেলে পার্শ্বে উল্লিখিত তালিকার যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- কীটনাশক বিকেল বেলায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১.০ লিটার
এমআইপিসি/ আইসোপ্রোকার্ব	মিপসিন ৭৫ ড্রিউপি	১.১২ কেজি
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ ড্রিউপি	১.৭০ কেজি
ম্যালাথিয়ন	ফাইফান ৫৭ ইসি	১.১২ লিটার

৬. শিষ কাটা লেদা পোকা

- ধান কাটার পর জমি চাষ দিয়ে বা নাড়া পুড়িয়ে জমিতে লুকিয়ে থাকা কীড়া ও পুলি মেরে ফেলুন, যার ফলে পরবর্তী মৌসুমে পোকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।
- জমিতে পার্টি করুন।
- দিনের আলোতে লুকিয়ে থাকা পোকাগুলো সংক্ষয় ধান গাছে দেখা গেলে ত্রি সময় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	

বিঃ দ্রঃ তালিকায় উল্লিখিত কীটনাশক ব্যতীত অন্য অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

➢ ধান লাগানোর পর আউশ ও রোপা আমন মৌসুমে ৩০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ৪০ দিন পর্যন্ত পোকার আক্রমণ ব্যতীত কীটনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

১৩/৩/১৮
বিভাগীয় প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ
তি, গাজীপুর।